



TERAPIA INTRA-MESODERMICA (MESOTERAPIA)

La mesoterapia è una tecnica terapeutica che si effettua usando farmaci tradizionali che vengono introdotti in piccolissime quantità (circa 0.1 ml) nella cute tramite iniezioni intradermiche multiple in corrispondenza delle zone affette da dolore e limitazione di movimento. La via di introduzione intradermica riduce gli effetti collaterali, evita la degradazione legata all'assorbimento orale e/o rettale (essendo il metabolismo cutaneo meno aggressivo di quello epatico) ed aumenta la compliance del paziente. La pratica clinica e la sperimentazione scientifica hanno dimostrato la permanenza del principio attivo in loco fino a 5 giorni, consentendo, quindi, una frequenza anche settimanale delle sedute. Le iniezioni possono essere eseguite su tutte le parti corporee (arti inferiori, addome, arti superiori, ...) a distanza di circa 2 cm l'una dall'altra (più ravvicinate per il viso e il décolleté).

MECCANISMO D'AZIONE:

Il meccanismo d'azione della mesoterapia è riconducibile a due effetti principali:

- Antalgico: si interviene direttamente sulle terminazioni nervose.
- Farmacologico: i farmaci vengono assorbiti senza passare attraverso il filtro epatico, che ne inattiva una parte.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Le indicazioni terapeutiche sono molteplici:

- Patologie dolorose del rachide cervicale
- Patologie dolorose del rachide dorsale
- Patologie dolorose del rachide lombare
- Patologie dolorose dell'arto superiore ed inferiore

PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE

L'indicazione al trattamento viene posta in seguito ad un esame clinico, alla somministrazione di schede di valutazione specifiche ed esami strumentali (RX, RMN ecc..).

Il protocollo prevede dalle 3 alle 6 sedute a cadenza settimanale in relazione alle condizioni cliniche del paziente e un successivo periodo di mantenimento da stabilire in base ai risultati ottenuti.

FASE POST-TRATTAMENTO

Dopo il trattamento, se necessario, è consigliabile l'applicazione di creme lenitive sulle parti trattate, mentre si sconsiglia l'esposizione a raggi UV (sole e lampade), l'esecuzione di saune, massaggi, linfo drenaggi.

CONTROINDICAZIONI

- Ipersensibilità nei confronti del farmaco iniettato
- Emofilia
- Sindromi emorragiche
- Gravidanza
- Terapia cronica con anticoagulanti
- Malattie cardiache

EFFETTI COLLATERALI

- Dolore
- Infezione
- Sanguinamento, ecchimosi, ematomi
- Reazioni vagali (vertigini, svenimenti)
- Reazioni allergiche (ai farmaci e/o ai materiali medicali)
- Atrofia cutanea e/o depigmentazione della cute anche a distanza di mesi

Traumatologia dello sport "Kirk Kilgour"
www.traumatologiadellosport.com

Ospedale Sant'Andrea
Via di Grottarossa 1035, Roma
+39 0633775344

Casa di cura Sanatrix
Via di Trasone 61, Roma
+39 06.86320409 - 06.86321981

Clinica Madonna della Fiducia
Via Alfredo Baccarini 54, Roma
+39 06.78850005 - 06.78462812